



En el Marco del Proyecto 397-PNICP-PIAP-2014

INFORME MENSUAL: octubre de 2017

EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS EN LA AMAZONÍA PERUANA: Sistema de Alerta para la Previsión



Foto: Creciente en el río Amazonas, 2012

Elaboración: Ing. Lucio Vergara S. (ANA) lvergara@ana.gob.pe

Revisión: Dr. Jhan Carlo Espinoza (IGP) jhan-carlo.espinoza@igp.gob.pe

Octubre, 2017

Lima-Perú

CONTENIDO

- I. Introducción
- II. Objetivo
- III. Datos hidroclimáticos
- IV. Análisis de las condiciones iniciales
 - 4.1. Análisis de las condiciones globales del clima
 - a. Temperatura superficial del mar
 - b. Circulación atmosférica global
 - c. Flujos de humedad y su divergencia
 - 4.2. Análisis de la precipitación
 - a. Anomalías de precipitación últimos 30 días, TRMM
 - b. Evolución temporal de anomalías de precipitación
 - 4.3. Análisis de registro de niveles de ríos
- V. Análisis de las previsiones
 - 5.1. Análisis de la temperatura superficial del mar
 - a. Pronóstico de la región Niño 3.4
 - b. Pronóstico de la región NATL
 - 5.2. Análisis del pronóstico de las precipitaciones
- VI. Conclusiones
- VII. Referencias

EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS EN LA AMAZONÍA PERUANA:

Sistema de Alerta para la Previsión

I. Introducción

El presente informe mensual del estudio “Eventos Hidrológicos Extremos en la Amazonía Peruana: Sistema de Alerta Cualitativo para la Previsión”, está elaborado en el marco del observatorio ORE-HYBAM y es posible gracias al convenio interinstitucional entre la Autoridad Nacional del Agua y el Instituto Geofísico del Perú. Asimismo, este documento constituye un producto del proyecto 397-PNICP-PIAP-2014. Esta cooperación interinstitucional tiene como objetivo la elaboración e implementación del estudio en mención, con la finalidad de contar con un sistema estacional que permita prever los impactos de los eventos hidrológicos extremos en la sociedad de la Amazonía peruana.

Durante los últimos años, estudios científicos han evidenciado la influencia de la temperatura superficial del mar anómalos de algunas regiones oceánicas circundantes en la ocurrencia de eventos hidrológicos extremos en la Amazonía peruana, como es descrito en Espinoza et al. (2009, 2011, 2012a y 2013) y Yoon & Zeng (2010), así como en Lavado et al. (2012), entre otros.

En este informe mensual correspondiente al mes de octubre 2017, se presentan los resultados del análisis de las condiciones actuales hasta el último día del mes y la previsión de las variables hidroclimáticas para los próximos 03 meses.

II. Objetivo

Establecer el sistema de alerta cualitativo estacional que permita conocer, bajo un criterio técnico, las condiciones hidrológicas más probables de los principales ríos Amazónicos peruanos durante las estaciones críticas del año. Esto permitirá prever la posible ocurrencia de eventos hidrológicos extremos.

III. Conjunto de Datos

La base de datos de las variables hidroclimáticas, se viene actualizando diariamente, semanalmente y mensualmente con información proveniente de diferentes agencias internacionales de investigación del clima y disciplinas afines, así como de servicios nacionales y locales. Para más detalle revisar el primer informe mensual y complementario correspondiente al mes de setiembre de 2013.

IV. Análisis de Condiciones Iniciales

4.1. Condiciones Globales y Regionales del Clima

En esta sección presentamos el análisis de las anomalías de temperatura superficial del mar (TSM) del Pacífico ecuatorial y Atlántico tropical, de la circulación atmosférica regional con dominio de América del Sur (50°N a 60°S, 0°W a 150°W), asimismo, el análisis de los flujos de humedad y su divergencia en la región (20°N a 30°S, 100°W a 20°W). Las informaciones provienen de la Administración Nacional Oceánica Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés). Las anomalías de TSM son reportados en grados Celsius (°C) y las anomalías de vectores de viento son reportados en m/s, ambos en formato gráfico.

a) Anomalías de Temperatura Superficial del Mar (TSM)

Durante el mes de octubre de 2017, la región del Pacífico ecuatorial Central (Niño 3.4) mostró anomalías negativas de TSM de -0.5°C en promedio (región parcialmente de color verde pálido en Fig. 1 y Tabla 1). Asimismo, la región del Pacífico ecuatorial Este (Niño 1+2) mostró anomalías negativas de TSM de -1.3°C en promedio (Tabla 1 y dominio de color verde en Fig. 1) con un descenso considerable respecto al mes de setiembre. El Comunicado Oficial N°15-2017 (noviembre) del ENFEN reportó que la TSM en la región Niño 3.4 y 1+2 se incrementaron las condiciones frías, debido a la intensificación de los vientos alisios y la presencia de ondas Kelvin frías.

La TSM en la región del Atlántico tropical Norte (NATL) mostró condiciones cálidas con anomalías positivas de 0.2°C en promedio (predominancia de color amarillo pálido, ver Fig. 1 y Tabla 1), con un ligero descenso de las condiciones respecto a setiembre. Por otro lado, se observó un ligero ascenso de las anomalías positivas de TSM respecto al mes de setiembre, de 0.2°C en promedio, en la región Atlántico tropical Sur (SATL; ver Fig. 1 y Tabla 1).

En resumen, la TSM en las regiones del Pacífico ecuatorial central, muestran condiciones más frías de lo normal, pero en las regiones del Atlántico tropical,

muestran condiciones ligeramente más cálidas de lo normal, sin embargo, en el rango neutral durante el mes de octubre 2017 (Fig. 1).




Fig. 1: Anomalías de temperatura superficial del mar (TSM) en °C del mes de octubre de 2017. Las anomalías son calculadas utilizando la climatología del periodo base 1971-2000. Fuente NOAA/NCEP.


OCTUBRE 2017								
MES	TSM PACÍFICO				TSM ATLÁNTICO			
	NIÑO 1+2		NIÑO 3.4		N. ATL		S. ATL	
	0-10S	90W-80W	5N-5S	170W-120W	5N-20N	60W-30W	0-20S	30W-10E
OCT 16	0.4	21.2	-0.7	26.0	0.4	28.5	0.2	23.6
NOV 16	0.1	21.7	-0.6	26.1	0.6	28.3	0.2	24.2
DIC 16	0.5	23.4	-0.4	26.2	0.6	27.4	0.5	25.2
ENE 17	1.2	25.8	-0.3	26.3	0.4	26.4	0.4	26.0
FEB 17	1.6	27.8	0.1	26.9	0.3	25.9	0.0	26.6
MAR 17	1.9	28.5	0.1	27.3	0.1	25.7	0.1	27.2
ABR 17	0.9	26.5	0.3	28.1	0.3	26.2	0.2	27.2
MAY 17	0.8	25.1	0.5	28.3	0.5	26.9	0.2	26.4
JUN 17	0.1	23.0	0.6	28.2	0.5	27.3	0.5	25.4
JUL 17	-0.1	21.5	0.4	27.6	0.6	27.8	0.1	23.9
AGO 17	-0.5	20.2	-0.2	26.7	0.5	28.3	0.3	23.4
SET 17	-0.7	19.7	-0.4	26.3	0.4	28.5	0.1	23.2
OCT 17	-1.3	19.5	-0.5	26.2	0.2	28.3	0.2	23.6

Tabla 1. Temperatura superficial del mar (Anomalías 1ra. columna y °C 2da. columna) para los últimos 12 meses. Las anomalías son variaciones respecto a la

climatología de 1981-2010 (Smith & Reynolds, 1998), de regiones oceánicas relevantes para la previsión de eventos extremos en la Amazonía peruana.

b) Anomalías de la Circulación Atmosférica

Se observó una intensificación de vientos del este en el noroeste de la cuenca amazónica. Por otro lado, al extremo este de la cuenca del Amazonas se observó ingreso de los vientos Alisios del sureste (Fig. 2). Sin embargo, estos vientos fueron direccionados hacia el suroeste de la cuenca del Amazonas y cuenca del río de La Plata. Además, se observó un debilitamiento de vientos del este en el Pacífico ecuatorial Este (Fig. 2).



Data Source: NCEP/CDAS - Climatology (1981-2010)
(Wind speed > 1 ms⁻¹ shaded)

Fig. 2: Vectores de Anomalías de viento en niveles bajos (850 hPa) de la atmósfera, (del 06 de octubre al 04 de noviembre de 2017). Las anomalías fueron calculadas utilizando el periodo base los promedios entre 1981 y 2010. Fuente: NOAA/NCEP.

c) Anomalías de Transporte de Humedad y su Divergencia

Los flujos de humedad y su divergencia fueron elaborados con datos de reanálisis NCEP/NCAR de la NOAA, con una resolución espacial de 2.5°x2.5° y resolución temporal diaria. El periodo de análisis es del año 1970 al presente (47 años), en la región entre 20°N-30°S y 100°W-20°W.

El flujo de humedad integrado verticalmente, F_w , en un punto de cuadrícula está dado por la siguiente ecuación:

$$F_w = \frac{1}{g} \int_{1000}^{300} q \cdot V \cdot dp$$

donde g es la aceleración de la gravedad, q es la humedad específica, V es el vector de viento horizontal, y p es la presión. Los flujos son integrados desde la superficie hasta 300 hPa, para más detalle revisar Satyamurty *et al.* (1998).




Fig. 3: Anomalías de flujo de humedad integrado en los niveles de 1000 hPa a 300 hPa de la atmósfera (vectores) y su divergencia (colores). El periodo corresponde de 01 al 31 de octubre 2017. Las anomalías son calculadas utilizando el periodo base de 1970 a 2016. Los límites de la cuenca Amazónica se muestran en línea verde.

En la Figura 3 se observa una fuerte divergencias de flujos de humedad en gran parte de la cuenca Amazónica, acentuadas alrededor de la cuenca del río Branco, sur de la cuenca Amazónica, incluyendo parte norte de la Amazonía boliviana y la región central de la Amazonia peruana. Por otro lado, se muestran convergencia de flujos de humedad en parte norte de la Amazonía peruana, Amazonía colombiana, ecuatoriana y venezolana. Además, esta convergencia de flujos de humedad se

observa en la región de la desembocadura y la región sureste de la cuenca Amazónica.

4.2. Análisis de Precipitaciones

Esta sección presenta el análisis de las anomalías de precipitación del producto de Radar Tropical Rainfall Measuring Mission a tiempo real (TRMM-3B42RT), para más detalle revisar Huffman et al. (2010). Los datos de TRMM-RT son reportados a paso de tiempo diarios a nivel global, pero procesados para la región de interés (10°N a 25°S; 85°W a 45°W) haciendo uso del programa Matlab®, mostrando anomalías de precipitación en mm/día.

a) Anomalías de Precipitación Radar TRMM-RT

Durante el periodo de 01 hasta 31 de octubre 2017, según datos de TRMM-RT, los valores de la precipitación fueron inferiores al promedio climatológico en gran parte de la región este de la cuenca del Amazonas (gran parte de la Amazonía ecuatoriana y peruana), cuyas anomalías alcanzaron en promedio -5 mm/día. Además, se observaron anomalías negativas de precipitación de hasta -4 mm/día en promedio en el extremo sureste de la cuenca del Amazonas (ver Fig. 4). Por otro lado, se observaron precipitaciones superiores al promedio climatológico en regiones localizados alrededor de la triple frontera Perú-Colombia-Brasil, sureste de la Amazonía boliviana, y en general en la región central este de la cuenca Amazónica.

Las condiciones de precipitación mostradas por la fuente de datos del TRMM-RT en la cuenca del Amazonas podrían atribuirse a las pocas incursiones de flujo de humedad desde el Atlántico tropical Norte y vientos del Este con menor intensidad (ver Fig. 2). Así, generándose divergencias de flujos de humedad sobre la región central oeste de la cuenca del Amazonas (Fig. 3) que originaron déficit de lluvias en gran parte de la región oeste de la cuenca Amazónica, gran parte de la Amazonía peruana (Fig. 4). Por otro lado, también se observa convergencia de flujo de humedad cercano a la región de la desembocadura lo que es coherente con las anomalías de precipitación positiva en esta región de la cuenca del Amazonas, adicionalmente, parte alta de la cuenca del río Negro.




Fig. 4: Anomalías de precipitación estimadas por el TRMM-RT en mm/día hasta 30 de octubre de 2017. Las anomalías fueron calculadas con respecto al periodo base promedio 2000-2016. Se muestra los límites de la cuenca Amazónica en líneas de color verde. Las anomalías de precipitación del TRMM-RT actualizadas a tiempo real puede verse en: <http://intranet.igp.gob.pe/eventos-extremos-amazonia-peruana/>.

b) Evolución Temporal de Anomalías de Precipitación para las Cuencas Amazónicas Peruanas

La evolución temporal de anomalías de precipitación para las principales cuencas hidrográficas de la Amazonía peruana fue calculada utilizando las estimaciones del producto TRMM-RT. El periodo para la obtención del armónico de la precipitación es del 2000 al 2016 para cada cuenca (la estación de Tamshiyacu en el río Amazonas, la estación de San Regis en el río Marañón y la estación de Requena en el río Ucayali. Ver ubicación de las estaciones y cuencas de drenaje en la Fig. 5). Los armónicos consisten en la representación de las fluctuaciones o variaciones en una serie de datos como la suma de una serie de funciones de senos y cosenos.

Utilizando el análisis de armónicos de la precipitación, se calculó la anomalía de precipitación diaria suavizadas mediante una media móvil de 15 días y la anomalía de precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico (01/09).




Fig. 5: Evolución temporal de anomalías de precipitación integradas en las principales cuencas hidrográficas de la Amazonía peruana: el río Amazonas hasta la estación Tamshiyacu (arriba), el río Marañón hasta la estación San Regis (medio) y el río Ucayali hasta la estación Requena (abajo). En la columna de la izquierda se observa la ubicación de las cuencas hidrográficas. En la columna del medio se muestran anomalías de precipitación. En la columna de la derecha se muestran anomalías acumuladas hasta la fecha indicada. En color azul se indican anomalías positivas de precipitación (valores por encima del promedio climatológico), en color rojo anomalías negativas de precipitación (valores por debajo del promedio climatológico). Las anomalías son calculadas considerando un periodo base de 2000 al 2016. La línea de color gris muestra la precipitación acumulada correspondiente a cada cuenca hidrográfica para el año 2009-2010. Para ver esta figura actualizada a tiempo real ir a: <http://intranet.igp.gob.pe/eventos-extremos-amazonia-peruana/>.

Las series temporales de precipitación promedio en las tres principales cuencas de la Amazonía peruana (Amazonas, Marañón y Ucayali) continúan presentando condiciones más secas de lo normal desde inicios del mes de setiembre, que sobrepasaron los -1.5 mm/día. Sin embargo, para las cuencas del río Amazonas y Marañón presentaron condiciones muy secas de lo normal que sobrepasaron los -2 mm/día; y para la cuenca del río Ucayali presento una anomalía de precipitación inferior a -2 mm/día (ver Fig. 5, columna central).

Por otro lado, en la cuenca del Amazonas hasta la estación de Tamshiyacu (cerca de Iquitos) la anomalía de precipitación acumulada para el presente año hidrológico es inferior al promedio climatológico. Además, en la cuenca del río Marañón se observa un mayor exceso de precipitación acumulada para el presente año hidrológico, que alcanza los 80 mm, esta cuenca presenta la mayor contribución a la precipitación acumulada a la cuenca de Tamshiyacu (Fig. 5, derecha). En el sur de la Amazonía peruana, en la cuenca del río Ucayali, la precipitación acumulada es deficitaria con magnitud de -120 mm en promedio, debido al poco ingreso de los flujos de humedad, de acuerdo con lo descrito en la Figura 3.

4.3. Análisis de Niveles de Agua de los Ríos

El SEHINAV (Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía) de la Dirección de Hidrografía y Navegación, reporta a tiempo real los histogramas de niveles de los ríos de la amazonía peruana a paso de tiempo diario en alturas geoidales y arbitrarias, dichos productos se pueden encontrar en el siguiente enlace: <https://www.dhn.mil.pe/shna/index2.asp>.

En términos de niveles de agua de los principales ríos de la Amazonía peruana, fueron analizados hasta el 15 de noviembre 2017, las estaciones del Marañón y Ucayali permanecen por encima del promedio climatológico. La estación de Tamshiyacu (río Amazonas) y la estación de Requena (río Ucayali) registraron anomalías de nivel de agua de 0.5%, en las estaciones de San Regis (río Marañón) y Yurimaguas (río Huallaga) registraron anomalías de nivel de agua sobre el promedio climatológico de 2.1% y 2.8% respectivamente, y la estación de Pucallpa (río Huallaga) registro anomalías positivas de nivel de agua de 0.1%. Continúa el contraste entre el norte y el sur de la Amazonía peruana coherente con la distribución de la precipitación acumulada observada en el mes pasado. En general, todos los ríos se encuentran en el tramo de ascenso, debido al incremento de precipitaciones en forma general en el mes de octubre (ver Fig. 5).




Fig. 6: Histograma de niveles de ríos diarios de los principales río de la Amazonía peruana.

Fuente: DHN (<https://www.dhn.mil.pe/>).

V. Análisis de las Previsiones

En este capítulo se analizan los pronósticos de las anomalías de temperatura superficial del mar en las regiones más relevantes (Niño 3.4, Niño 1+2, NATL y SATL). Además, se analizan las anomalías de precipitación para los próximos 03 meses, que corresponden a la temporada de estiaje en la región de la Amazonía peruana. Los reportes provienen de las agencias internacionales y nacionales de pronóstico del clima (IRI, NOAA, CPTEC e IGP).

5.1. Análisis de la Temperatura Superficial del Mar

Esta sección contiene los pronósticos de anomalía de temperatura superficial del mar a nivel global desarrollados por el International Research Institute for Climate and Society (IRI) y el US National Multi-Model Ensemble (NMME). Los gráficos de pronósticos del Pacífico ecuatorial y el Atlántico tropical fueron elaborados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en el marco del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

Según el reporte del NMME, los pronósticos de anomalías de TSM, para el trimestre diciembre 2017-febrero 2018 (DEF), para la región del Atlántico tropical Norte (NATL) se prevén condiciones cálidas débiles (dominio de color blanco, ver Fig. 7). Para la región del Atlántico tropical Sur (SATL) se pronostican condiciones neutras (región con predominancia de color blanco, ver Fig. 7). Por otro lado, en la región subtropical del Atlántico Sur se observarían condiciones cálidas de moderadas a fuertes (región con anomalías positivas de TSM superiores a 1.0°C, en forma concentrada, ver Fig. 7).

Para la región Niño 3.4 se proyectan condiciones frías de magnitud moderada a fuerte (2.0°C; dominio de color azul en Fig. 7), de igual manera, se proyectan temperaturas frías moderadas para la región Niño 1+2 (gran parte de color azul claro en Fig. 7). Por otro lado, el Comunicado Oficial ENFEN N° 15-2017 (noviembre) señala que, los modelos climáticos de las agencias internacionales muestran condiciones ligeramente frías en noviembre y condiciones neutras en diciembre para la región Niño 1+2, mientras que para la región del Pacífico Central (Niño 3.4) condiciones frías débiles hasta fin de año.




Fig. 7: Pronóstico de las anomalías de TSM (°C) a nivel global, para el trimestre diciembre 2017-febrero 2018 (DEF). Rectángulos rojos indican regiones de análisis. Fuente: *National Multi-Model Ensemble (NMME)*.

a) Pronóstico de la Región El Niño 3.4

Con respecto a los reportes de NMME (North American Multi-Model Ensemble), las proyecciones de las anomalías de TSM en el Pacífico ecuatorial Central (Niño 3.4) para los próximos 03 meses (NDE), presentarían condiciones frías moderadas de acuerdo con el ensamble de los modelos (anomalías de TSM por debajo del promedio climatológico con -0.9°C , ver Fig. 8). Sin embargo, durante los próximos meses mantendría una tendencia positiva a partir del mes de enero del año 2018 (ver Figura 8).




Fig. 8: Pronóstico de las anomalías de temperatura superficial del mar (TSM) por modelos acoplados para la región Niño 3.4 (5°N-5°S, 120°W-170°W) del Pacífico ecuatorial central, a partir de condiciones de fines de octubre 2017. Fuente: *Instituto Geofísico del Perú (IGP)*.

b) Pronóstico de la región Atlántico tropical Norte

Según el reporte del IGP elaborado con datos del NMME, los modelos de pronósticos de fines de octubre 2017 pronostican que las anomalías de TSM en el Atlántico tropical Norte (NATL) para el próximo trimestre noviembre 2017-enero 2018 (NDE) mostrarían condiciones ligeramente cálidas (anomalías de TSM por encima del promedio climatológico con 0.3°C en promedio se mantendrían, pero, dentro del rango neutral, ver Fig. 9).




Fig. 9: Pronóstico de las anomalías de temperatura superficial del mar (TSM) para la región del Atlántico tropical Norte (NATL: 5°N-20°N, 30°W-60°W), a partir de condiciones de fines de octubre 2017. Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP).

5.2. Análisis del Pronóstico de las Precipitaciones

Según el reporte del CPTEC, el pronóstico de anomalías de precipitaciones para los próximos 03 meses noviembre-enero (NDE) 2017-2018 con datos observados de fines de octubre, mostrarían dominio de condiciones normales en gran parte de la cuenca del Amazonas. No obstante, en la región Andino-Amazónica del Perú, se mostrarían anomalías de precipitación superiores al promedio climatológico, incluyendo la Amazonía boliviana, con un exceso de 1 mm/día en promedio (Fig. 10). Sin embargo, se observaría anomalías inferiores al promedio climatológico en el extremo oeste de la cuenca del Amazonas (cercano a la desembocadura del río Amazonas), con déficit de precipitación hasta -2 mm/día, así como en gran parte de la región este de la Amazonía colombiana.




Fig. 10: Pronóstico de las anomalías de la precipitación (mm/día) método ras para el trimestre NDE del 2017-2018 en América del Sur, con datos observados del mes de octubre. Fuente: CPTEC/INPE.

VI. Conclusiones

Durante el mes de octubre 2017, el Pacífico ecuatorial Central (región Niño 3.4) registró condiciones frías (anomalías negativas de TSM de -0.5°C). Asimismo, la región Niño 1+2 presentó condiciones frías moderadas (anomalías negativas de TSM de -1.3°C) con un descenso respecto al mes anterior, según lo indicado por el ENFEN en su Comunicado Oficial N°15-2017 (noviembre). Sin embargo, el Atlántico tropical Norte (NATL) mostró condiciones cálidas con anomalías positivas de TSM de 0.2°C y condiciones cálidas débiles con anomalías positivas de TSM de 0.2°C para el Atlántico tropical Sur (SATL).

Para el periodo de análisis (octubre) se observó un debilitamiento del ingreso de humedad desde el Atlántico tropical Norte hacia la cuenca Amazónica y una fuerte divergencia de flujos de humedad en gran parte de la cuenca Amazónica, incluyendo gran parte de la Amazonía boliviana. Esto originó déficit de lluvias en gran parte de la región oeste de la cuenca del Amazonas, sur de la Amazonía colombiana y gran parte de la Amazonía peruana y ecuatoriana. Sin embargo, las regiones con divergencias de flujos de humedad son coherentes con las anomalías negativas de precipitación y los niveles de agua del río Ucayali (estación de Requena y Pucallpa ubicadas al sur de la Amazonía peruana) que permanece muy cercano al promedio climatológico, todos los ríos se encuentran en una etapa de ascenso a crecidas.

Respecto a las condiciones oceánicas para el próximo trimestre (NDE), el ENFEN señala en su Comunicado Oficial ENFEN N° 15-2017 (noviembre) que muestran condiciones ligeramente frías en noviembre y condiciones neutras en diciembre para la región Niño 1+2, mientras que para la región Niño 3.4 condiciones frías débiles hasta fin de año. Diferentes estudios han mostrado una relación entre la ocurrencia de La Niña y más precipitaciones en la Amazonía peruana, incluyendo la ocurrencia de eventos de inundaciones extremas durante los meses de enero a abril, tal como fue el caso en 2012 (Espinoza et al., 2013). Dada las condiciones actuales en el Pacífico ecuatorial, se podría esperar una época de lluvias más intensa en la amazonía peruana. Esto se continuará monitoreando continuamente.

La base de datos de las variables hidroclimáticas se sigue actualizando continuamente, recopilando informaciones provenientes de diferentes agencias internacionales de investigación del clima e instituciones locales (NOAA, IRI, CPTEC, SENAMHI, etc.). Desde el mes de febrero 2015 las variables de precipitación se encuentran a tiempo real en la página web <http://intranet.igp.gob.pe/eventos-extremos-amazonia-peruana/>.

VII. Referencias

- Espinoza J. C., Guyot J-L, Ronchail J, Cochonneau G, Filizola N, Fraizy P, de Oliveira E, Ordoñez J J and Vauchel P (2009). Contrasting regional discharge evolutions in the Amazon basin (1974–2004) *J. Hydrol.* 375 297–311
- Espinoza J. C., Ronchail J., Guyot J. L., Junquas C., Vauchel P., Lavado W., Drapeau G. y Pombosa R. (2011). "Climate variability and extreme drought in the upper Solimões

- River (western Amazon Basin): Understanding the exceptional 2010 drought". *Geophys. Res. Lett.* 38 L13406.
- Espinoza J. C., Ronchail J., Frappart F., Lavado W., Santini W., y Guyot J. L. (2012a). The Major Floods in the Amazonas River and Tributaries (Western Amazon Basin) during the 1970–2012 Period: A Focus on the 2012 Flood. *Journal of Hydrometeorology*.
- Espinoza J. C., Lengaigne M. Ronchail J., Janicot S. (2012b). Large-Scale circulation Patterns and related rainfall in the Amazon basin: a Neuronal Networks approach. *Climate Dynamics*. 38. 121-140. DOI. 10.1007/s00382-011-1010-8
- Espinoza, J.C., Ronchail, J., Frappart, F., Lavado, W., Santini, W., and Guyot, J.L. (2013). The Major Floods in the Amazonas River and Tributaries (Western Amazon Basin) during the 1970–2012 Period: A Focus on the 2012 Flood, *J. Hydrometeorol*, 14, 1000–1008.
- Espinoza J.C. Marengo J.A. Ronchail J. Molina J., Noriega L., Guyot J.L. 2014. The extreme 2014 flood in south-western Amazon basin: The role of tropical-subtropical south Atlantic SST gradient. *Environm. Res. Lett.* 9 124007 doi:10.1088/1748-9326/9/12/124007.
- Janowiak, J. E., and P. Xie. (1999). CAMS-OPI: A global satellite-rain gauge merged product for real-time precipitation monitoring applications. *Journal of Climate* 12:3335-3342.
- Huffman G.J., R.F. Adler, D.T. Bolvin, E.J. Nelkin, (2010) "The TRMM Multi-satellite Precipitation Analysis (TMPA)". Chapter 1 in *Satellite Applications for Surface Hydrology*, F. Hossain and M. Gebremichael, Eds. Springer Verlag, ISBN: 978-90-481-2914-0, 3-22.
- Lavado W., Labat D., Ronchail J., Espinoza J.C., Guyot J.L. (2013). Trends in rainfall and temperature in the Peruvian Amazon-Andes basin over the last 40 years (1965-2007). *Hydrological Processes*. 41, 2944-2957. doi: 10.1002/hyp.9418
- Lavado W. & Espinoza J.C. (2014). "Impactos de El Niño y La Niña en las Lluvias del Perú (1965-2007)", *Revista Brasileira de Meteorología*, v.29, n.2, 171-182.
- Lavado C W S, Ronchail J, Labat D, Espinoza J C and Guyot J L (2012). "Basin-scale analysis of rainfall and runoff in Peru (1969–2004): Pacific, Titicaca and Amazonas watersheds" *Hydrol. Sci. J.* at press (doi:10.1080/02626667.2012.672985).
- Satyamurty P., Nobre C. A., Silva Dias P.L. (1998). "Tropics - South America". In: Karoly DJ, Vincent DG (Org.) *Meteorology and hydrology of the Southern Hemisphere*. Boston: *Meteorology Monograph*. 49:119–139.
- Yoon J. H. y Zeng H. (2010). "An Atlantic influence on Amazon rainfall". *Clim. Dyn.* 34 249–64.