



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

PP 068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres"

Producto: “Estudios para la estimación de los riesgos de desastres”

Actividad: “Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño”

Instituto Geofísico del Perú

INFORME TÉCNICO N° PpR/El Niño-IGP/2024-06

11/07/2024

Advertencia: El presente informe sirve como insumo para la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN). El pronunciamiento colegiado de la comisión multisectorial del ENFEN es la información oficial definitiva. La presente información podrá ser utilizada bajo su propia responsabilidad.

Resumen

En mayo, según el valor del Índice Costero El Niño (ICEN), se presentó la condición neutra (-0.61), la misma condición se esperaría para el ICEN temporal (ICEN-tmp) de junio (-0.88) y julio (-0.63). La mayoría de los pronósticos climáticos internacionales y nacionales indican un escenario de anomalías negativas de la TSM frente a la costa peruana hasta mayo de 2025; sin embargo, estos valores se mantendrían en el rango neutral. Por lo pronto, no se configura un evento La Niña costera.

En el Pacífico central, el Índice Oceánico Niño (ONI, por sus siglas en inglés) de mayo (0.39), así como valores del ONI temporal de junio (0.11) y julio (-0.29), indica la condición neutra pero con una tendencia negativa. El promedio de los pronósticos de los modelos climáticos muestra que en agosto se iniciaría un evento La Niña en el Pacífico central, el que se extendería, por lo pronto, hasta mediados de otoño de 2025, alcanzando su máxima intensidad a finales de la primavera de 2024. Para el verano 2024-2025 el promedio de los modelos indica que La Niña tendría una magnitud débil.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Introducción

Empezando el año 2016, en el marco del programa presupuestal 068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres", algunas instituciones que conforman la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN), bajo la coordinación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), participan en el producto "Estudios para la estimación de los riesgos de desastres", en el cual el IGP contribuye con la actividad denominada "Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño". El presente informe técnico se genera en el marco de esta actividad, el cual se entrega al IMARPE, como coordinador de la actividad y encargado de la presidencia de la comisión multisectorial, para contribuir a la evaluación periódica que dicha comisión realiza. El informe técnico, generado posteriormente por la comisión multisectorial, será el documento oficial sobre el monitoreo y pronóstico del fenómeno El Niño/La Niña en el Perú.

Índice Costero El Niño

Utilizando la versión 5 de la información reconstruida y extendida de la temperatura superficial del mar (TSM), denominada ERSSTv5, se calculó el valor del ICEN (región Niño 1+2) para mayo de 2024, el cual indica la condición neutra (Tabla 1). Para el cálculo del ICEN se utilizan los datos que son denominados como “datos en tiempo real”, los que son actualizados en el transcurso de los siguientes meses. Por este motivo, existirán pequeñas discrepancias en el valor del ICEN para los meses anteriores cuando se use la data actualizada.

Tabla 1. Valores recientes del ICEN y sus respectivas categorías (columnas 3 y 4).

Año	Mes	ICEN	Categoría
2024	Febrero	0.98	Cálida Débil
2024	Marzo	0.57	Cálida Débil
2024	Abril	-0.11	Neutra
2024	Mayo	-0.61	Neutra

Para los siguientes dos meses se generan valores preliminares y temporales del ICEN (ICENTmp), que se calculan usando el promedio de los pronósticos de la anomalía de la TSM de NMME de un mes y dos meses para el primer y segundo ICENTmp, respectivamente. Los valores del ICENTmp de junio y julio se encuentran dentro de la categoría neutra. (Tabla 2).

Tabla 2. ICEN temporales y sus categorías para abril y mayo 2024.

Año	Mes	ICENTmp	Categoría
2024	Junio	-0.88	Neutra
2024	Junio	-0.63	Neutra



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Índice Oceánico Niño (ONI)

Para el Pacífico central (región Niño 3.4), el valor del ONI (*Ocean Niño Index* en inglés) de mayo de 2024 es 0.39 °C, el que corresponde a una categoría neutra¹.

Tabla 3. Valores recientes del ONI. Descarga: <http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt> (se usan los datos en tiempo real, por lo que puede haber discrepancias para los meses anteriores).

Índice Oceánico Niño			
Año	Mes	ONI (°C)	Categoría
2024	Febrero	1.50	Cálida Fuerte
2024	Marzo	1.15	Cálida Moderada
2024	Abril	0.75	Cálida débil
2024	Mayo	0.39	Neutra

Los valores estimados del ONI (ONItmp) de junio y julio de 2024, usando datos observados y de los pronósticos de NMME, se encuentran en la categoría neutra (Tabla 4).

Tabla 4. Estimados preliminares del ONI (ONItmp)

Índice Oceánico Niño temporales			
Año	Mes	ONItmp (°C)	Categoría
2024	Junio	0.11	Neutra
2024	Julio	-0.29	Neutra

Diagnóstico del Pacífico ecuatorial

Durante junio y la primera semana de julio, la anomalía de la TSM (ATSM) diaria registrada en la región Niño 3.4, en promedio, estuvo alrededor del rango neutral, pero con una ligera tendencia positiva hasta la última semana de junio para luego cambiar a una tendencia negativa lenta hasta la fecha. Por otro lado, en la región Niño 1+2, la ATSM en promedio estuvo en la condición neutra, aunque a mediados de junio se observó un rápido incremento que alcanzó 0.5 °C, aproximadamente, en la primera semana de julio (Figura 1). Según la información mensual de los datos obtenidos de las boyas de TAO, la magnitud de los vientos alisios (promediado entre 2°S-2°N) continuó más intenso de lo normal en todo el Pacífico ecuatorial (Figura 2a). Se mantiene la tendencia negativa de la ATSM, aunque aún se observan valores positivos en casi todo el Pacífico ecuatorial (Figura 2b). Con respecto a la profundidad de la termoclina, en promedio, se mantiene menos profunda de lo normal en casi toda la región ecuatorial a excepción del extremo oriental (Figura 2c y Figura 3). La información diaria del esfuerzo de viento (Figura 4a) muestra, principalmente, el desarrollo de un pulso de viento del este entre 180° y 130°W en el Pacífico central.

¹ Los umbrales para establecer la categoría de condiciones cálidas o frías débiles, moderadas, fuertes, y muy fuertes usando el ONI son ± 0.50 , ± 1.00 , ± 1.50 , y ± 2.00 , respectivamente (Nota Técnica ENFEN, 02-2015)



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

El extremo oriental de la piscina caliente mantiene una tendencia hacia su posición climatológica (línea morada continua en los paneles de la Figura 4). En la zona oriental, la ATSM del producto OSTIA (Figura 4d) mantiene una tendencia negativa con valores negativos de la ATSM en la zona oriental.

El OLR (Outgoing Longwave Radiation) en junio e inicios de julio, en la zona occidental (170°E - 140°W , 5°S - 5°N) y oriental (170°W - 100°W , 5°S - 5°N), mostró valores cercanos a su climatología (Figura 5 y 6).

Según la información de altimetría satelital a lo largo de la franja ecuatorial (Figura 7), se siguen observando ondas de Kelvin frías y cálidas débiles en junio e inicios de julio, donde una cálida habría iniciado su arribo. Asimismo, continúan presentes ondas de Rossby cálidas en la zona occidental que podrían reflejarse como ondas de Kelvin cálidas. Por otro lado, según la profundidad de la termoclina de los flotadores ARGO, el paquete de ondas de Kelvin frías debió haber iniciado su arribo a la zona oriental durante junio y, últimamente, una onda de Kelvin cálida estaría arribando. Finalmente, entre 160°W y 140°W , se observa una onda de Kelvin fría (Figura 4b).

Ondas de Kelvin a lo largo de la costa peruana

A lo largo de la costa peruana, dentro de los 100 km, se vuelve a observar un nuevo incremento del nivel del mar que, a la fecha, ha sido más intenso entre 4°S y 2°S , como consecuencia de la llegada de una onda de Kelvin cálida (Figura 8b). Esta onda de Kelvin cálida pudo haber impactado la anomalía de la TSM, la que mostró valores positivos al norte de 4°S (Figura 9). La información cada 5 días del flotador Argo No. 6903002, localizado alrededor de las 50 mn y en 3.4°S , mostró una tendencia hacia valores normales de la anomalía de la temperatura del mar hasta los 80 m; mientras que por debajo de esta profundidad se observaron anomalías positivas (ver Figura 10).

Pronóstico de ondas de Kelvin

Según la información de altimetría satelital, no se esperan mayores impactos de las ondas de Kelvin y Rossby, tanto frías como cálidas, por ser aparentemente débiles (Figura 7). En la profundidad de la termoclina, según lo observado a la fecha, se espera que la onda de Kelvin cálida mantenga la termoclina más profunda de lo normal en la zona oriental (Figura 4b). Según el último pulso de viento del este que se observa en el producto CMEMS (Figura 4a), se esperaría un conjunto de ondas de Kelvin frías que podrían iniciar su arribo a la costa peruana a partir de agosto.

El pronóstico de los modelos de ondas del IGP forzado con el *reanalysis* de NCEP para el diagnóstico y luego con vientos igual a cero para el pronóstico, indica que se espera el arribo de una onda de Kelvin fría entre fines de julio e inicios de agosto (Figuras 11 y 12). Hay que tener en cuenta que estos modelos no simulan los procesos de dispersión modal relacionadas a la inclinación de la termoclina, por lo que es posible que la onda en cuestión pierda algo de su energía antes de arribar a la costa americana (Figura 13).

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Pronóstico estacional con modelos climáticos

Para la región Niño 1+2, los pronósticos de los modelos climáticos de NMME (CFSv2, CanCM4i-IC3, GEM5-NEMO, NASA-GEOS2S, GFDL_SPEAR², COLA-RSMAS-CCSM4 y COLA-RSMAS-CESM1), con condiciones iniciales de julio, indican que el ICEN se encontraría entre el rango neutral entre agosto de 2024 y mayo de 2025; esto a pesar de tener valores negativos (ver Tabla 5 y Figura 14).

Tabla 5. Pronósticos del ICEN de los modelos climáticos con condiciones iniciales de junio de 2024

Modelo	JAS	ASO	SON	OND	NDE	DEF	EFM	FMA	MAM	AMJ
CFS2	-0.31	-0.21	-0.13	-0.23	-0.39	-0.43	-0.30	-0.12	NaN	NaN
CanCM4i	-1.50	-1.86	-2.26	-2.59	-2.49	-2.04	-1.58	-1.53	-2.16	-2.93
GEM5_NEMO	0.15	0.35	0.32	0.20	0.11	0.21	0.35	0.43	0.11	-0.23
NASA	-0.87	-0.92	-0.96	-1.08	-1.15	-1.12	-0.94	NaN	NaN	NaN
GFDL_SPEARE	-0.21	-0.19	-0.13	-0.10	-0.05	0.04	0.21	0.32	0.47	0.60
COLA_CCSM4	-0.40	-0.24	-0.20	-0.37	-0.54	-0.50	-0.27	0.02	0.33	0.74
COLA_CESM1	-0.26	-0.10	0.00	-0.04	-0.17	-0.24	-0.17	-0.01	0.14	0.27
Promedio										
NMME	-0.49	-0.45	-0.48	-0.60	-0.67	-0.58	-0.39	-0.15	-0.22	-0.31

Para el Pacífico central (región Niño 3.4), según los pronósticos de los mismos modelos del párrafo anterior, para el ONI, en agosto la condición sería fría débil, mientras que entre setiembre de 2024 y febrero de 2025 se esperaría la categoría fría moderada. Finalmente, entre marzo y mayo de 2025 la condición sería fría débil. De acuerdo a estos resultados, La Niña en el Pacífico central se iniciaría en agosto y se extendería, por lo pronto, hasta mediados de otoño de 2025. Para el verano se espera que La Niña tenga una magnitud débil (ver Tabla 6 y Figura 15).

Tabla 6. Pronósticos del ONI de los modelos climáticos con condiciones iniciales de junio de 2024.

Modelo	JAS	ASO	SON	OND	NDE	DEF	EFM	FMA	MAM	AMJ
CFS2	-0.49	-0.88	-1.17	-1.28	-1.25	-1.06	-0.82	-0.53	-----	-----
CanCM4i	-1.27	-1.58	-1.72	-1.90	-2.04	-2.06	-2.00	-2.14	-2.58	-3.04
GEM5_NEMO	-0.61	-0.95	-1.05	-0.95	-0.94	-0.91	-0.84	-0.72	-0.62	-0.54
NASA	-1.03	-1.49	-1.62	-1.72	-1.85	-1.83	-1.70	-----	-----	-----
GFDL_SPEARE	-0.05	-0.30	-0.54	-0.74	-0.79	-0.64	-0.37	-0.09	0.09	0.20
COLA-CCSM4	-0.71	-1.03	-1.14	-1.18	-1.14	-0.98	-0.67	-0.28	0.04	0.25
COLA_CESM1	-0.69	-1.11	-1.28	-1.31	-1.21	-1.05	-0.88	-0.67	-0.47	-0.28
Promedio										
NMME	-0.69	-1.05	-1.22	-1.30	-1.32	-1.22	-1.04	-0.74	-0.71	-0.68

² Desde febrero de 2021, el modelo GFDL_SPEARS (<https://www.gfdl.noaa.gov/spear/>) reemplaza a los modelos GFDL_CM2.1 y GFDL_FLOR.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

El modelo de IA del IGP (Rivera Tello et al., 2023), con condiciones iniciales de junio, indica que el índice E, relacionado a El Niño en la región oriental del Pacífico (Niño E), se mantendría con valores por debajo de lo normal y que recién alcanzaría sus valores normales a finales del verano de 2025. Por lo pronto, no existe la probabilidad que en enero de 2025 se desarrolle un Niño E fuerte. Por otro lado, para el índice C, relacionado a El Niño en el Pacífico central (Niño C), se pronostica una tendencia negativa que alcanzaría su máximo valor negativo a fines del verano de 2025 (Figura 16).

El modelo IGP RESM-COW v1 (Montes et al, 2023), con condiciones iniciales de julio, pronostica condiciones normales hasta el mes de julio, en los meses siguientes se observa una tendencia positiva del ICEN, que va del rango de cálida débil en agosto hasta cálida extraordinaria en enero de 2025. En relación a este resultado, se han detectado inexactitudes en las rutinas de preprocesamiento de la información relacionada a la generación de las condiciones iniciales y de frontera que requiere el modelo regional WRF para el pronóstico, por lo que se ha iniciado una revisión de las mismas para evaluar su potencial impacto en las predicciones generadas. Mientras se realiza dicha revisión, se recomienda cuidado en la utilización de las salidas del modelo, particularmente considerando que dichas salidas indican un escenario distinto al resto de modelos de predicción. Asimismo, se debe tener en cuenta que es necesario un mayor número de corridas (miembros de *ensemble*) y, eventualmente, incorporar datos de otros modelos globales para tener una mejor estimación de los posibles escenarios (Figura 17).

Conclusiones

El ICEN de mayo indica la categoría neutra, al igual que los ICEN temporales de junio y julio. Por otro lado, las anomalías diarias de la TSM en la región Niño 1+2 se encuentran, en promedio, dentro de su rango normal en lo que va de julio.

Según la información observada y los resultados de los modelos de ondas (forzados con vientos del *reanalysis* de NCEP), se espera que las ondas de Kelvin frías continúen afectando la costa peruana, por lo pronto, hasta agosto; sin embargo, las observaciones actuales indican que las ondas frías no están teniendo un impacto efectivo en la TSM. Hay que indicar que el pulso intenso de viento del este del producto CMEMS no se observa, a la fecha, en otras fuentes de datos como TAO o el *reanalysis* de NCEP.

En relación a las proyecciones climáticas, tanto de los modelos internacionales como el modelo de IA, se espera un escenario de anomalías negativas de la TSM frente a la costa peruana hasta mayo de 2025, pero estos valores se mantendrían dentro del rango neutral. Por lo pronto, no se configura un evento La Niña costera.

En el Pacífico central, el ONI de mayo, así como los temporales de junio y julio, se encuentra en la categoría neutral y con una tendencia negativa. El promedio de los pronósticos de los modelos climáticos indica que en agosto debería iniciar La Niña en el Pacífico central, la que se extendería, por lo pronto, hasta mediados de otoño de 2025, alcanzando su máxima intensidad a finales de la primavera de 2024 inicios de 2025. De darse este escenario, no debería descartar el desarrollo de precipitaciones por debajo de lo normal en la sierra centro y sur durante la primavera (Lagos et al., 2008; Lavado-Casimiro y Espinoza, 2014; Sulca et al., 2017).



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Bibliografía

- **Aparco J., K. Mosquera y K. Takahashi**, 2014: Flotadores Argo para el cálculo de la anomalía de la profundidad de la termoclina ecuatorial (Aplicación Operacional), Boletín Técnico "Generación de modelos climáticos para el pronóstico de la ocurrencia del Fenómeno El Niño", Instituto Geofísico del Perú, mayo, 1, 5.
- Cravatte, S., W. S. Kessler, N. Smith, S. E. Wijffels, Ando, K., Cronin, M., Farrar, T., Guilyardi, E., Kumar, A., Lee, T., Roemmich, D., Serra, Y., Sprintall, J., Strutton, P., Sutton, A., **Takahashi, K.** y Wittenberg, A., 2016: First Report of TPOS 2020. GOOS-215, 200 pp. [<http://tpos2020.org/first-report>]
- DiNezio, P., 2016: Desafíos en la predicción de La Niña, Boletín Técnico "Generación de modelos climáticos para el pronóstico de la ocurrencia del Fenómeno El Niño", Instituto Geofísico del Perú, 3 (9), 4-8.
- ENFEN, 2012: Definición operacional de los eventos “El Niño” y “La Niña” y sus magnitudes en la costa del Perú. Nota Técnica ENFEN.
- ENFEN, 2015: Pronóstico probabilístico de la magnitud de El Niño costero en el verano 2015-2016. Nota Técnica ENFEN 02-2015.
- Huang, B., Thorne, P.W, Banzon, V. F., Boyer, T., Chepurin, G., Lawrimore, J. H., Menne, M. J., Smith, T. M., Vose, R. S., Zhang, H.-M., 2017: Extended Reconstructed Sea Surface Temperature version 5 (ERSSTv5): Upgrades, validations, and intercomparisons, *J. Climate*, doi: [10.1175/JCLI-D-16-0836.1](https://doi.org/10.1175/JCLI-D-16-0836.1)
- Kug, J.-S., Jin, F.-F., An, S.-I., 2009: Two types of El Niño events: Cold tongue El Niño and warm pool El Niño. *J. Climate* 22, 6, 1499–1515, doi:10.1175/2008JCLI2624.1.
- **Lagos, P., Silva, Y., Nickl, E., & Mosquera, K.** (2008). El Niño-related precipitation variability in Perú. *Advances in Geosciences*, 14, 231-237. <https://doi.org/10.5194/adgeo-14-231-2008>.
- Lavado-Casimiro, W., **Espinoza, J. C.**, 2014: Impactos de El Niño y La Niña en las lluvias del Perú (1965-2007), *Revista Brasileira de Meteorologia*, 29 (2), 171-182.
- Meehl G, Hu A, Teng H, 2016: Initialized decadal prediction for transition to positive phase of the Interdecadal Pacific Oscillation. *Nature Communications*, doi: 10.1038/ncomms11718
- **Montes, I., Segura, B., Castellón, F., Manay, R., Mosquera, K. y Takahashi, K.**, 2023: Pronósticos experimentales del posible FEN para la Comisión ENFEN con un modelo de Sistema Tierra de alta resolución para el territorio nacional y el Pacífico oriental. Informe Técnico, p. 16.
- **Morera, S. B.**, Condom, T., Crave, A., Steer, P., and Guyot, J. L., 2017: The impact of extreme El Niño events on modern sediment transport along the western Peruvian Andes (1968-2012). *Scientific Reports*, v. 7, No. 1, p. 11947 DOI:10.1038/s41598-017-12220-x.



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- **Mosquera, K.**, 2009: Variabilidad Intra-estacional de la Onda de Kelvin Ecuatorial en el Pacífico (2000-2007): Simulación Numérica y datos observados. Tesis para obtener el grado de Magíster en Física - Mención Geofísica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- **Mosquera, K., B. Dewitte y P. Lagos**, 2010: Variabilidad Intra-estacional de la onda de Kelvin ecuatorial en el Pacífico (2000-2007): simulación numérica y datos observados. Magistri et Doctores, Revista de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Año 5, No9, julio-diciembre de 2010, p. 55.
- **Mosquera, K.**, 2014: Ondas Kelvin oceánicas y un modelo oceánico simple para su diagnóstico y pronóstico, Boletín Técnico "Generación de modelos climáticos para el pronóstico de la ocurrencia del Fenómeno El Niño", Instituto Geofísico del Perú, Enero, 1, 4-7.
- **Mosquera, K. y Dewitte, B.** (2016). ¿Por qué las ondas Kelvin oceánicas no impactaron tanto la TSM en la costa de Perú durante el evento El Niño 2015/16?. Boletín técnico: Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño, Instituto Geofísico del Perú, 3 (3), 4-8.
- Ramos, Y., 2015: El cambio climático y la lluvia en la costa norte. Boletín técnico: “Generación de modelos climáticos para el pronóstico de la ocurrencia del Fenómeno El Niño”, Instituto Geofísico del Perú, 2(8), 4-8.
- **Reupo, J. y Takahashi, K.**, 2014: Validación de pronósticos con modelos globales: Correlaciones de TSM (1982-2010). Boletín Técnico "Generación de modelos climáticos para el pronóstico de la ocurrencia del Fenómeno El Niño", Inst. Geofísico del Perú, Enero, 1, 8-9.
- **Rivera Tello, G.A., Takahashi, K. & Karamperidou, C.** Explained predictions of strong eastern Pacific El Niño events using deep learning. Sci Rep 13, 21150 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-45739-3>
- **Sulca, J., Takahashi, K., Espinoza, J.C., Vuille, M. and Lavado-Casimiro, W.**, 2017: Impacts of different ENSO flavors and tropical Pacific convection variability (ITCZ, SPCZ) on austral summer rainfall in South America, with a focus on Peru. Int. J. Climatol. Doi:10.1002/joc.5185.
- **Takahashi, K.**, 2017: Verificación de los pronósticos probabilísticos de El Niño y La Niña costeros. Boletín Técnico "Generación de modelos climáticos para el pronóstico de la ocurrencia del Fenómeno El Niño", Instituto Geofísico del Perú, 4 (8), 8-9.
- **Takahashi, K., Montecinos, A., Goubanova, K., & Dewitte, B.**, 2011: ENSO regimes: reinterpreting the canonical and Modoki El Niño. Geophysical Research Letters, 38 (10). <https://doi.org/10.1029/2011GL047364>
- **Takahashi, K., Martínez, A. G.**, 2016: The very strong El Niño in 1925 in the far-eastern Pacific. Climate Dynamics, doi: 10.1007/s00382-017-3702-1.
- Thoma M, Greatbatch R, Kadow C, Gerdes R, 2015: Decadal hindcasts initialized using observed surface wind stress: Evaluation and prediction out to 2024. Geophys. Res. Lett. doi:10.1002/2015GL064833
- **Urbina, B. y K. Mosquera**, 2020: Implementación y validación de un modelo oceánico multimodal para la región ecuatorial del océano Pacífico. Boletín científico El Niño, Instituto Geofísico del Perú, Vol. 7 N° 01, 13-20.



Ministerio
del Ambiente

Instituto
Geofísico del Perú



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Nota: Los Boletines Técnicos del IGP citados se pueden encontrar en:

<https://repositorio.igp.gob.pe/>

Equipo

Kobi Mosquera, Dr. (responsable)

Jorge Reupo, Lic.

José Obregón, Lic.

Miguel Andrade, Bach.

Jeremy Romero, Bach.

Agradecimientos

A la Dra. Emily Becker (NOAA) y al Dr. Ben Kirtman (RSMAS) por su apoyo con los datos del proyecto NMME



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 1. Series de tiempo de la anomalía diaria de la TSM en la región Niño 3.4 (arriba) y en la región Niño 1+2 (abajo). Las líneas en color negro (gruesa), gris y negro (fina) indican la evolución de la anomalía de la TSM usando información infrarroja (IR), microondas (MW) y del producto OSTIA, respectivamente. Las líneas de color verde, rojo, celeste, azul y morado indican la evolución de la anomalía de la TSM para los periodos 1971-1973, 1981-1983, 1990-1992, 1996-1998 y 2014-2016. Elaborado por el IGP.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 2. Promedio mensual a lo largo de la franja ecuatorial del Pacífico (2°S-2°N) de las anomalías del viento zonal (panel izquierdo), de la temperatura superficial del mar (panel central) y de la profundidad de la isoterma de 20 °C (panel derecho). Esta imagen se elaboró de otras que se obtienen del proyecto TAO: www.pmel.noaa.gov/

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Promedio de la profundidad de la isoterma de 20°C(m) de los últimos 30 días



Figura 3. Profundidad de la isoterma de 20°C, como promedio de los últimos 30 días. Fuente ARGO.
Elaboración: IGP.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 4. Diagrama longitud-tiempo en la franja ecuatorial de las anomalías, de izquierda a derecha, a) del esfuerzo de viento zonal (ASCAT), b) de la profundidad de la termoclina (ARGO), c) del nivel del mar (DUACS) y d) de la temperatura del mar (OSTIA). La línea morada continua (entrecortada) indica laposición observada (climatológica) de la isoterma de 28.5 ° C. Elaborado por el IGP.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 5. Actividad convectiva en el Pacífico central oriental (170°E – 140°W y 5°S – 5°N) en base a la información de OLR. Elaborado por el IGP.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 6. Actividad convectiva en el Pacífico central oriental (170°W – 100°W y 5°S – 5°N) en base a la información de OLR. Elaborado por el IGP.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 7. Diagramas longituditud-tiempo de la anomalía del nivel medio del mar en el Pacífico ecuatorial usando el producto DUACS. Los paneles (a) y (c) son los mismos y representan la información a lo largo de la línea ecuatorial; mientras que (b), a lo largo de 4°N, pero con el eje zonal de este a oeste. Las líneas diagonales indican la trayectoria teórica de la onda de Kelvin (a y c) y Rossby (b) si tuvieran una velocidad aproximada de 2.6 m/s y 0.87 m/s, respectivamente. Elaborado por el IGP.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 8. Anomalia del nivel del mar a lo largo de la franja ecuatorial (panel superior) y a lo largo de la costa peruana (panel inferior). Las unidades están en centímetros. Elaborado por el IGP.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
Geofísico del Perú



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 9. Anomalia de la TSM dentro de los 300 km de la costa peruana. Elaborado por el IGP.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 10. A la izquierda se aprecia la anomalía de la temperatura del mar hasta los 500 metros de profundidad, calculada de los datos del flotador ARGO No. 6903002. Esta anomalía se calcula en base a la climatología (1981-2010) de: (a) GODAS, (b) SODA e (c) IMARPE. A la derecha se aprecia la trayectoria del flotador en el último año. Cada color indica un periodo de aproximadamente 30 días y el círculo abierto representa la última posición del flotador. Elaborado por el GP.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 11. Diagrama longitud-tiempo de (a), diagrama de la onda de Rossby (b) diagrama de la onda de Kelvin, (c) diagrama de la onda de Rossby, calculado con el Modelo oceánico lineal (LOMIGP), forzando por NCEP y termoclina constante
Fuente: IGP.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 12. Igual que la Figura 45 pero el modelo es forzado con termoclina variable. Fuente: IGP.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 13. Simulación numérica de la anomalía del nivel del mar (cm) a lo largo de la franja ecuatorial del océano Pacífico (panel superior) y a lo largo de la costa peruana (panel inferior). Esta simulación se realizó con el modelo oceánico lineal (LOM) forzado con esfuerzo de viento del reanalysis de NCEP. La línea verde entrecortada indica el inicio de la simulación del pronóstico con esfuerzo de viento igual a cero. Elaborado por el IGP.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 14. Índice Costero El Niño (ICEN, línea negra con círculos llenos, fuente ERSSTv5) y sus valores temporales (ICENv5tmp, rojo con círculo lleno). Además, pronósticos numéricos del ICEN (media móvil de 3 meses de las anomalías pronosticadas de TSM en Niño 1+2) por diferentes modelos climáticos. Los pronósticos de los modelos CFSv2, CanCM4i, GEM5_NEMO, NASA, GFDL_SPEAR y NCAR_CCSM4, COLA-RSMAS-CCSM4, COLA-RSMAS-CCSM1 tienen como condición inicial de julio de 2024. Fuente: IGP, NOAA, NMME.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
Geofísico del Perú



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Condiciones Iniciales de Julio 2024




Figura 15. Índice Niño 3.4 mensual observado (líneas de color plomo) y pronosticado por los modelos de NMME (líneas de distintos colores). Fuente: NMME.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 16. Pronóstico del índice E (Takahashi et al., 2011) a doce meses basado en un modelo de inteligencia artificial (Rivera Tello et al., 2023) para el pronóstico de El Niño extremo. (a) Muestra la evolución del índice E, representado con una línea gruesa de color negro, desde octubre a abril de 2024; el conjunto de líneas entrecortadas de colores indica el pronóstico del índice E desde mayo de 2024 a abril de 2025. (b) Es lo mismo que (a) pero para el índice C (Takahashi et al., 2011). Desde (c) a (n), semuestra la “Explicabilidad” (explainability) de cuatro variables, en anomalías, usadas para el pronóstico: temperatura superficial del mar (primera fila), nivel del mar (segunda fila), viento zonal (tercera fila) y viento meridional (cuarta fila). Estas variables se obtienen de distintos meses: febrero (primera columna), marzo (segunda columna) y abril (tercera columna). Los contornos rojos (morados) de estos paneles indican regiones que favorecen (desfavorecen) al pronóstico de El Niño extremo.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
Geofísico del Perú



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”




Figura 17. Pronóstico del ICEN de julio de 2024 a enero de 2025, generado por el Modelo Regional Earth SystemModel CROCO-OASIS-WRF v.1' (IGP RESM-COW v.1) con condiciones iniciales de julio.

